

ASTERICS – Perlodes



Dokumentation

Teil I Historie

(herausgegeben Mai 2020)

UNIVERSITÄT
DUISBURG
ESSEN

Offen im Denken



Inhaltsverzeichnis

ASTERICS 2.....	4
Version 2.0 Datum unbekannt	4
Version 2.3 April 2004	4
Version 2.5 Mai 2005	5
ASTERICS 3.....	6
Version 3.0 Mai 2006	6
Version 3.1 Februar 2008	6
Version 3.1.1 Mai 2008	7
Version 3.3 Juni 2011	7
ASTERICS 4.....	9
Version 4.0 Dezember 2013	9
Perloides Online	10
Version 5.0 Februar 2020	10

Entwicklung

Die Software ASTERICS (ab Version 2.0) sowie das ihr zugrunde liegende deutsche Bewertungsverfahren PERLODES wurde im Rahmen diverser Forschungsvorhaben über die Jahre stetig weiterentwickelt. Gefördert wurde dies in erster Linie vom Umweltbundesamt und der Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA).

Die in der Software implementierte Taxaliste wurde 2001 durch das AQEM-Konsortium¹ zusammengestellt und in den Folgejahren fortgeführt. Dazu zählen auch die mit der Liste verknüpften Autökologischen Informationen, die den folgenden Quellen entstammen:

- Moog, O. (Ed.) (1995): Fauna Aquatica Austriaca. 1. Auflage, Wasserwirtschafts-Kataster, Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Wien.
- Schmedtje, U. und M. Colling (1996): Ökologische Typisierung der aquatischen Makrofauna. Informationsberichte des Bayerischen Landesamtes für Wasserwirtschaft 4/96.
- Informationen, die durch das AQEM-Konsortium gesammelt wurden.

Die jüngste Weiterentwicklung (Abkehr von der Desktop-Fassung hin zu einer reinen Online-Version) erfolgte im Rahmen des vom Umweltbundesamt geförderten Projekts „Online-Version der Systeme zur biologischen Fließgewässerbewertung“ (Förderkennzeichen 3716 24 209 0).

Die Programmierung von PERLODES ONLINE erfolgte durch:



IRV-Software
Ing. Robert Vogl
Breitenfurterstraße 107-109/3/17
A-1120 Wien
Österreich
<http://www.irv-software.at>

Support

Im Falle von Problemen, Fragen oder Anregungen wenden Sie sich bitte an

- peter.rolauffs@uni-due.de (Verfahren & Inhalte)
- joerg.strackbein@uni-due.de (Tools & Technik)
- info@fliessgewaesserbewertung.de

¹ AQEM ist das Acronym eines von der EU geförderten Forschungsprojekts: The Development and Testing of an Integrated Assessment System for the Ecological Quality of Streams and Rivers throughout Europe using Benthic Macroinvertebrates (Contract No: EVK1-CT1999-00027).

ASTERICS 2

Version 2.0 | Datum unbekannt

Grundlegendes

- Integration aller deutschen Fließgewässertypen anhand der Berechnung des gewässertypspezifischen Faunaindex (Modul ‚Organische Belastung‘) (*Hintergrund: Version 1.0 war beschränkt auf die Bewertung des Stressors „Degradation der Gewässermorphologie“ und beinhaltete lediglich 5 der 20 damals existierenden Typen*)
- Bewertung der Typen 4 und 21 ausschließlich über organische Belastung
- Umstellung auf eine deutsche Oberfläche, die das Komma als Dezimaltrennzeichen akzeptiert (*Hintergrund: Version 1.0 wurde im Rahmen eines internationalen Forschungsvorhabens entwickelt*)
- Übersetzung der Hilfe-Funktion und des Handbuchs ins Deutsche

Indizes

- Integration des Potamon-Typie-Index

Version 2.3 | April 2004

Grundlegendes

- Erweiterung des offiziellen deutschen Bewertungsverfahrens auf die Module „Allgemeine Degradation“ und „Versauerung“ (Ausnahmen: Typen 4 und 21 – hier nur Bewertung der saprobiellen Belastung; Versauerung nur für die Typen 5 und 5.1)
- Software-Datenbank (1): Ergänzung aller Taxa der Operationellen Taxaliste
- Software-Datenbank (2): Einarbeitung der DV-Nummern
- Software-Datenbank (2): Ergänzung von Einträgen der Coleoptera ohne Angabe zum Entwicklungsstadium (Verknüpfung zur Deutschlandliste)

Indizes

- Implementierung einer Reihe weiterer Indizes zur Unterstützung der Interpretation von Bewertungsergebnissen

Version 2.5 | Mai 2005Grundlegendes

- Integration einer Filterfunktion zum automatischen Zurücksetzen auf Befunde aus der Operationellen Taxaliste
- Software-Datenbank: Ergänzung zahlreicher, für Marschengewässer typische Arten

ASTERICS 3

Version 3.0 | Mai 2006

Grundlegendes

- Bezeichnung: deutsches Bewertungsverfahren erhält den Namen PERLODES
- Gesamtergebnis: Berechnung der Ökologischen Zustandsklasse (ÖZK) wird erstmals von der Software durchgeführt
- Ergebnisdarstellung: Auftrennung der Ergebnisse in 6 verschiedene Tabellenblätter:
 - Ökologische Zustandsklasse
 - Saprobie | Allgemeine Degradation | Versauerung
 - Metrics
 - Taxaliste
- Export: Ermöglichung des Ergebnisexports nach Excel und/oder Access

Version 3.1 | Februar 2008

Grundlegendes

- Batchmodus: Bereitstellung eines Bausteins zur automatisierten Berechnung großer Datenmengen
- Import: Abgleich der Importlisten mit den datenbankinternen Synonymen
- Herstellung der Kompatibilität zum Betriebssystem Windows Vista

Bewertung

- Typen 6_K und 9.1_K: Implementierung von Faunaindizes
- Typ 15_groß: Überarbeitung des bestehenden Faunaindex
- Ströme: Erweiterung des Verfahrens auf Einzelproben (*spot samples*)
- Einführung von Qualitätskriterien zur Absicherung der Bewertung

Indizes

- Integration neuer (internationaler) Metrics

zu beachten

- Aufgrund von Fehlern in der softwareinternen Datenbank kam es bei Befundlisten, die mit der Version 3.1 berechnet wurden, zu falschen Metricergebnissen, die sich auch auf die Bewertung auswirkten. Mit der Veröffentlichung von Version 3.1.1 wurden diese Fehler korrigiert. Ergänzende Anmerkung: Version 3.0 (und frühere Versionen) waren von diesen Datenbankfehlern nicht betroffen.
- Aufgrund einer Überarbeitung des Faunaindex Typ 15_groß konnte es zu mehr oder weniger großen Abweichungen in den Ergebnissen im Vergleich zu denen der Version 3.0 kommen.

Version 3.1.1 | Mai 2008

Grundlegendes

- Update ist ausschließlich auf die Behebung von Fehlern ausgerichtet und beinhaltet keine technischen oder funktionalen Veränderungen
- Anpassung der DV-Nummern in der Software-Datenbank an den aktuellen Stand der Deutschlandliste (70 Positionen)

zu beachten

- DV-Nummern: Um Komplikationen beim Import nicht kodierter Taxa auszuschließen, wurden DV-Nummern neu in die Datenbank aufgenommen bzw. bestehende Kodierungen aktualisiert. Dadurch bedingt kann es zu geringfügigen Unterschieden zwischen den Ergebnissen der Version 3.1.1 und früheren Versionen kommen.

Version 3.3 | Juni 2011

Grundlegendes

- Optimierung des Batch-Modus (Erstellung eines Ablaufprotokolls; Unterdrückung von Fehlermeldungen)
- Aktualisierung der autökologischen Einstufungen einiger Indizes (Faunaindizes: FI 11/12, FI 14/16/18, FI 15/17; Potamon-Typie-Index; Präferenzen für Biozönotische Region; Salinität)
- Export: Erweiterung auf das csv-Format
- Herstellung der Kompatibilität zum Betriebssystem Windows 7

Bewertung

- Typ 14 / Litoral [%]: Metric entfällt
- Typ 15 / Pelal [%]: Metric entfällt
- Typ 16 / #Trichoptera: Anhebung des oberen Ankerpunkts von 10 auf 12
- Typ 19 / Faunaindex: Umstieg auf eigenständigen Index (Bewertung erfolgte bis dato über den Faunaindex der Typen 11 und 12); oberer Ankerpunkt = 1,55; unterer Ankerpunkt = -0,15
- Typ 19 / #Trichoptera: Anhebung des oberen Ankerpunkts von 6 auf 10
- Ströme/ PTI: Aktualisierung der ECO-Werte sowie Anpassung der Klassengrenzen gemäß den Angaben der BfG (Gegenüberstellung der Klassengrenzen alt/neu siehe „*Dokumentation Teil III Beschreibung der Indizes*“:“)
- Neufestsetzung der Mindestanforderungen für ein gesichertes Ergebnis im Modul „Allgemeine Degradation“; Grundlage ist die Abundanzsumme des Faunaindex²
 - Gewässertypen 1.1 bis 9.2: AS > 20 (QK 1 bis 3) bzw. AS > 15 (QK 4 oder 5)
 - Gewässertypen 11 bis 19: AS > 15 (QK 1 bis 3) bzw. AS > 10 (QK 4 oder 5)

² AS = Abundanzsumme; QK = Qualitätsklasse

- Anzahl Indikatortaxa: Ergänzung um einen Hinweis auf Artenverarmung (*low indicator taxa number*) bei Unterschreiten des Schwellenwerts 6
- Angabe des Neozoenanteils (Modul „Allgemeine Degradation“); Einblendung des Hinweises *high share of alien species* bei Überschreiten des Schwellenwerts 30%

Indizes

- Integration der SPEAR-Indizes zur Indikation des Eintrags von Pestiziden sowie weiteren toxisch-organischen Verbindungen (weitere Details siehe „*Dokumentation_Teil III_Beschreibung der Indizes*“)

ASTERICS 4

Version 4.0 | Dezember 2013

Grundlegendes

- Implementierung des Verfahrens zur Bewertung von HMWB

Indizes

- Implementierung des Index „Wärmeliebende Neozoen“

Anmerkung

- Der Index „Wärmeliebende Neozoen“ wurde zur Indikation thermischer Belastungen von Fließgewässern des Typs 15_groß entwickelt. Nähere Informationen gibt folgender Artikel:
KORTE, T. & M. SOMMERHÄUSER: Auswirkungen des Klimawandels auf die Bewertung „Großer sand- und lehmgeprägter Flüsse des Tieflands“ (Korrespondenz Wasserwirtschaft / Wasser und Boden 2012 (5) Nr. 6: 309-315)

Perloides Online

Version 5.0 | Februar 2020

Grundlegendes

- Umstellung von ASTERICS (Desktop) auf Perloides Online
- Gleichzeitige Berechnung von NWB und HMWB
- Beschränkung der Einstellungen Gewässertyp, Filteroption und Nutzungsart auf die Importliste (die Möglichkeit, Einstellungen nachträglich zu ändern oder erst nach dem Import festzulegen, entfällt damit)
- Neu-Organisation der Ergebnisdarstellung (eine Probe = eine Spalte); damit verbunden ist eine Aufteilung der Ergebnisse des Moduls „Allgemeine Degradation“ auf 4 Tabellenblätter
- Bereitstellung neuer Export-Formate (export_liste; JSON); Export nach Access entfällt
- Neu-Kodierung der Ergebniszeilen für die Exportformate export_liste (Excel), export_kompakt (csv) und JSON

Bewertung

- Typ 5 / HR%: Core Metric entfällt
- Typ 6_K / Hws als neue Fallgruppe für HMWB

Indizes

- Aktualisierung der ECO-Werte (PTI) gemäß den Vorgaben der BfG
- Aktualisierung des SPEAR_{Pestizide} (betrifft Algorithmus und Indikatorwerte)
- Implementierung des KLIWA-Index
- Implementierung der Faunaindizes 2.0
- Implementierung weiterer Indizes (Grundwassereinfluss, Trockenfallende Gewässer)
- Reduzierung der Gesamtzahl berechneter Indizes
(Details siehe „*Dokumentation_Teil III_Beschreibung der Indizes*“: letzte Seite)

Version 5.0.6 | Mai 2020

Exportdateien

export_listen: Erweiterung des Tabellenblattes „ÖZK“ um die Spalten Q bis U zur Anzeige der NWB-Vergleichsergebnisse; Bezeichnung der Überschriften:
AD_Vgl_Qklasse, AD_Vgl_Ergebnis, AD_Vgl_gesichert / ÖZK_Vgl, ÖZK_Vgl_gesichert

Anmerkung: Versionierungen innerhalb der Beta-Phase (Februar bis Ende April) werden nicht gesondert ausgewiesen.